

【本報港聞部報道】就最近多宗虐殺動物事件，若毒物已從胃進入腸道後，狗主可即時用鹽類的瀉藥，讓狗隻盡量排出毒物，減少吸收。有專業人士表示，虐畜人士大多是自尊心較低，個人承受太多壓力，因而以殘害比自己較弱少的動物來獲取滿足感，平衡心理。由於傷人較為嚴重，傷害動物則較難遭到告發，因而令他們選擇以此來抒發積忿。

可用鹽類瀉藥助排毒物

香港心理衛生會助理總幹程志剛昨日接受本報查詢時表示，施暴者難以一概而論，但很大機會是自尊心低、自卑、較難以控制情緒，又或是承受多方壓力的人，他們以報復或殘害比自己更弱少的動物，以動物的無助感來獲取滿足感，平衡自己的心理，「又或是曾被動物咬傷，對其感到厭惡而作出殘害行為。加上傷害動物沒有傷人般嚴重，亦較難遭到告發」。他續稱，若發現自己難以控制情緒，會衝動地傷害小動物，應正視及尋找輔導服務或臨床心理學家幫助。

愛護動物協會在網頁上有指出，若狗隻中毒後，短時間會出現以下徵狀，例如嘔吐、腹瀉、顫抖、呼吸困難、抽搐、昏倒，甚至死亡。催吐是狗隻吃入毒物後，短時間內可進行急救措施，可以用阿朴嗎啡緩慢地注射入靜脈，又或是在肌肉、皮下注射，但若食入毒物後已超過四小時，則不能使用催吐藥物。若毒物已從胃進入腸道後，可用鹽類的瀉藥，如硫酸鈉或硫酸鎂，讓狗隻盡量排出毒物，減少吸收。

狗主在遛狗時應留意犬隻的情況，因狗隻或會於散步後，舔下殘留於足上的毒藥，而引起上述中毒的症狀。另狗主應時刻看管犬隻，並使用狗帶，亦應避免狗隻吃下地上的任何物件，最好戴上網形口罩，進一步減低吞下毒餌的風險，而若犬隻在散步後出現問題，應立即帶其往獸醫診所診治。